

PREPARACIÓN CON PLEINVUE® • C.N. 721059-7 POR LA TARDE

En los 4 días previos a la colonoscopia **no debe tomar ninguna medicación que contenga Hierro.**

En los 5 días previos a la colonoscopia se le aconsejará sobre la suspensión de fármacos **anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios (adiro, Plavix, etc).**



DURANTE 72 HORAS seguirá una **dieta pobre en residuos:**

PUEDE TOMAR

Arroz, pastas y caldos
Carne, pescado a la plancha o hervido (con unas gotitas de aceite)
Queso duro
Galleta sin fibra y pan tostado
Zumos filtrados
Café, té e infusiones
Bebidas singas

NO PUEDE TOMAR

Ensaladas
Verduras, legumbres y patatas
Carnes y pescados en salsa
Fruta
Embutidos
Leche, grasas y pasteles
Bebidas con gas
Cereales, quinua, etc.



24 horas antes de la prueba: **DIETA LÍQUIDOS CLAROS** (Agua, caldos filtrados, infusiones, té, bebidas sin burbujas, (Nestea®, Aquarius®, etc.).


CÓMO TOMAR PLEINVUE®

DÍA DE LA COLONOSCOPIA PROGRAMADA:

-A las **06:00** horas beber 1/2 litro de **PLEINVUE®**, un vasito cada **15-20 minutos**. Diluirlo en agua o zumo.
Se recomienda beberlo refrigerado y alternando con los líquidos claros.
IMPORTANTE: Debe beber al menos 1/2 LITRO DE LÍQUIDOS CLAROS.

- A las **09:00** horas beber 1/2 litro de **PLEINVUE®**, un vasito cada **15-20 minutos**. Diluirlo en agua o zumo.
Se recomienda beberlo refrigerado y alternando con los líquidos claros. Lentamente durante **60 minutos**.
IMPORTANTE: A continuación, además debe beber al menos 1/2 LITRO DE LÍQUIDOS CLAROS.

DESDE 4 H. ANTES DE LA COLONOSCOPIA PERMANECERÁ EN AYUNO ABSOLUTO.



*Líquidos claros: agua, caldo, zumo de fruta sin pulpa, refrescos, té y/o café sin leche.

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES

Si su ritmo defecatorio es habitualmente ESTREÑIDO, es probable que requiera de una PREPARACIÓN ESPECIAL conocida como “PREPARACIÓN COLÓNICA OPTIMIZADA”:

Tres días previos a la TOMA DE PLEINVUE se le pautará 1 sobre de MOVICOL solución oral cada 8 horas y deberá beber abundantes líquidos después de cada toma.

De esta manera lograremos el máximo rendimiento diagnóstico de la colonoscopia.

TRES (3) DÍAS PREVIOS A PREPARACIÓN CON PLEINVUE



1 sobre cada 8 horas

