

VORBEREITUNG FÜR DIE KOLOSKOPIE MIT CITRAFLEET (C.N. 660393.2)

WENN IHR TERMIN AM MORGEN IST

-Wenn Sie Eisen- oder Ballaststoffpräparate (Plantago Ovata, Plantaben oder ähnliches) einnehmen

Stoppen Sie 5 Tage vor dem Scan.

-Wenn Sie ANTIKOAGULANZIEN und/oder THROMBOZYTENAGGREGATIONSHEMMER einnehmen , befolgen Sie die Empfehlungen Ihres Arztes.

3 TAGE VOR DEM SCAN FOLGT EINE RÜCKSTANDSARME DIÄT

SIE KÖNNEN NEHMEN	SIE KÖNNEN NICHT NEHMEN
<p>REIS, NUDELN UND BRÜHEN GEGRILLTER ODER GEKOCHTER FISCH UND HUHN (MIT EIN PAAR TROPFEN OLIVENÖL) WEICHKÄSE FASERFREIE KEKSE UND TOAST GEFILTERTE SÄFTE KAFFEE, MAGERMILCH, TEE, AUFGÜSSE STILLE GETRÄNKE</p>	<p>ROHES GEMÜSE UND GEMÜSE FRÜCHTE MIT SCHALEN UND SAMEN ROTES FLEISCH UND FISCH IN SAUCE VOLLWERTIGE UND FETTHALTIGE LEBENSMITTEL BRATWÜRSTE VOLLMILCH UND TEILENTRAHMTE MILCH NÜSSE, PRALINEN UND KUCHEN KOHLENSÄUREHALTIGE GETRÄNKE</p>

TAGVOR DER KOLOSKOPIE:

Frühstück und Mittagessen: Abfallarme Ernährung.

Nach dem Essen: DIÄT LIQUIDA ohne Milchprodukte: Fettfreie Brühe, gefilterte Säfte (ohne Fruchtfleisch), Aufgüsse (Tee, Pennyroyal, Kamille), Kaffee, isotonisches Getränk (Wassermann), Wasser.

BEGINNEN SIE DIE VORBEREITUNG MIT CITRAFLEET AM TAG VOR DER KOLOSKOPIE

Um 20:00 Uhr am Vortag: Sie nehmen den 1. UMSCHLAG von CITRAFLEET



Gelöst in 1 Glas mit 150 ml. von Wasser. Nach 30 Minuten beginnen Sie, **2**
Liter klare Flüssigkeiten zu trinken. "Beispiele: Isotonisches Getränk (Wassermann), fettfreie
Fleischbrühen, Aufgüsse (Tee, Pennyroyal, Kamille), Saft ohne Fruchtfleisch, Wasser". Sie werden die
Flüssigkeiten in den nächsten 3 Stunden langsam trinken.

Um 05:00 Uhr am Tag des Tests: Sie nehmen den 2. UMSCHLAG von CITRAFLEET



Gelöst in 1 Glas mit 150 ml. von Wasser. Nach 30 Minuten nehmen Sie
wieder 1 LITER UND EINE HÄLFTE klare Flüssigkeiten, so wie Sie es mit dem vorherigen Umschlag getan
haben.

AB 7 UHR MORGENS. UM IM TOTALEN FASTEN ZU BLEIBEN

Sie müssen begleitet werden und dürfen nicht fahren. Denken Sie daran, dass Sie am Tag der Untersuchung, wenn Sie DIAB É TICO fasten, keine oralen Antidiabetika oder Insulin einnehmen sollten.

BESONDERE UMSTÄNDE

Wenn Ihr Darmrhythmus normalerweise VERSTOPFT ist, benötigen Sie wahrscheinlich eine SPECIAL RATION PREP, die als "**POPTIMIZED COLONIC REPAIR**" bekannt ist:

Drei Tage vor der Einnahme von CITRAFLEET wird 1 Beutel **CASENLAX 10 gr alle 12** Stunden **verschrieben** und Sie sollten nach jeder Fütterung viel Flüssigkeit trinken.

Auf diese Weise erreichen wir die maximale diagnostische Leistung der Koloskopie.

DREI (3) TAGEVOR DER ZUBEREITUNG MIT CITRAFLEET



**1 Beutel alle 12
Stunden**

Informationen zur Koloskopie

