

Atemtest zum Nachweis von Helicobacter Pylori

Der Atemtest ist eine einfache, komfortable und nicht-invasive Diagnosemethode, mit der wir das Vorhandensein von Helicobacter pylori im Magen nachweisen können, einer Infektion, die an mehreren Magenerkrankungen beteiligt ist und außerdem in direktem Zusammenhang mit der Bildung von Geschwüren im Magen und im Zwölffingerdarm steht. Seine Erkennung ermöglicht es uns, eine spezifische Behandlung zur Beseitigung durchzuführen.

Empfehlungen zur korrekten Erkennung:

- 1.- Fasten Sie 8 Stunden lang (ohne Essen und Trinken).
- 2.- Vermeiden Sie die Einnahme von Antibiotika 4 Wochen vor dem Test.
- 3.- Nehmen Sie in den 15 Tagen vor dem Test keine Protonenpumpenhemmer (Omeprazol, Esomeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol, Rabeprazol) ein.
- 4.- In den 8 Stunden vor dem Test dürfen Sie weder rauchen noch sich körperlich betätigen.
- 5.- Nehmen Sie am Test teil, ohne Ihre Zähne geputzt, Zahnpasta oder Mundwasser verwendet zu haben.

