

VORBEREITUNG FÜR DIE KOLOSKOPIE MIT CITRAFLEET (C.N. 660393.2)

WENN IHR TERMIN AM NACHMITTAG IST

-Wenn Sie Eisen- oder Ballaststoffpräparate (Plantago Ovata, Plantaben oder ähnliches) einnehmen, Stoppen Sie die Einnahme 5 Tage vor dem Scan.

-Wenn Sie BLUTVERDÜNNER und/oder THROMBOZYTENAGGREGATIONSHEMMER einnehmen, befolgen Sie die Empfehlungen Ihres Arztes.

3 TAGE VOR DEM SCAN FOLGT EINE BALLASTSTOFFARME DIÄT

SIE KÖNNEN ZU SICH NEHMEN	ES IST VERBOTEN FOLGENDES ZU SICH SU NEHMEN
<p>REIS, NUDELN UND BRÜHEN GEGRILLTES ODER GEKOCHTES FLEISCH UND FISCH (MIT EIN PAAR TROPFEN OLIVENÖL) WEICKÄSE BALLASTSTOFFFREIE KEKSE UND TOAST GEFILTERTE SÄFTE KAFFEE, MAGERMILCH, TEE, AUFGÜSSE STILLE GETRÄNKE</p>	<p>ROHES GEMÜSE UND GEMÜSE FRÜCHTE MIT SCHALEN UND SAMEN ROTES FLEISCH UND FISCH IN SAUCE VOLLWERTIGE UND FETTHALTIGE LEBENSMITTEL BRATWÜRSTE VOLLMILCH UND TEILENTRAHMTE MILCH NÜSSE, SCHOKOLADEUND KUCHEN KOHLENSÄUREHALTIGE GETRÄNKE</p>

DER TAG VOR UNTERSUCHUNG:

Frühstück: Kaffee mit Magermilch mit Keksen (NICHT INTEGRAL) oder eine Scheibe geröstetes Weißbrot mit Schinken oder Truthahn, mit ein paar Tropfen Olivenöl.

Essen: Sie können eine gegrillte Hähnchenbrust oder gegrillten oder gekochten Fisch und flüssige Diät (fettfreie Brühe, Saft ohne Fruchtfleisch: Orange, Ananas, Apfel und Aufgüsse, Wasser) nehmen.

Abendessen: FLÜSSIGE NAHRUNG ohne Milchprodukte: Fettfreie Brühe, gefilterte Säfte (ohne Fruchtfleisch), Aufgüsse (Tee, Pennyroyal Minze, Kamille), Kaffee, isotonisches Getränk (Wassermann), Wasser.

AM TAG DER KOLOSKOPIE:

Um 07:00 Uhr: Sie nehmen den **1. UMSCHLAG** von **CITRAFLEET**

Gelöst in **1 Glas mit 150 ml. von Wasser.** **Nach 30 Minuten** beginnen Sie, **2 Liter klare Flüssigkeiten zu trinken.**

Beispiele: Wasser, isotonische Bebida (Aquarius), fettfreie Fleischbrühen, Tee und trinken Sie die Flüssigkeiten langsam bis zum nächsten Beutel.



Um 10:00 Uhr: Sie nehmen den **2. UMSCHLAG** von **CITRAFLEET**

Gelöst in **1 Glas mit 150 ml Wasser.** **Nach 30 Minuten** trinken Sie **1,5 Liter klare Flüssigkeiten, so wie Sie es mit dem vorherigen Beutel getan haben.**



AB 12 UHR MITTAGS NICHTS MEHR ZU SICH NEHMEN (weder fest noch flüssig). Sie müssen begleitet werden und dürfen nicht fahren. Denken Sie daran, dass Sie am Tag der Untersuchung, wenn Sie **DIABETIKER** sind, keine oralen Antidiabetika oder Insulin einnehmen sollten.

BESONDERE UMSTÄNDE

Wenn Ihr Darmrhythmus normalerweise **VERSTOPFT** ist, benötigen Sie wahrscheinlich ein **SPEZIELLES** PRÄPARAT, das als "**OPTIMIERTE KOLONPRÄPARATION**" bekannt ist:

Drei Tage vor der Einnahme von CITRAFLEET nehmen Sie alle 12 Stunden 1 Beutel **CASENLAX 10 g** ein und nach jeder Mahlzeit müssen Sie viel Flüssigkeit trinken.

Auf diese Weise erreichen wir die maximale diagnostische Leistung der Koloskopie.

DREI (3) TAGE VOR DER ZUBEREITUNG MIT CITRAFLEET



1 Beutel alle 12 Stunden

Informationen zur Koloskopie

