

PREPARACIÓN CON PLEINVUE® • C.N. 721059-7

POR LA TARDE

En los 7 días previos a la colonoscopia **no debe tomar ninguna medicación que contenga Hierro.**

En los 5 días previos a la colonoscopia se le aconsejará la suspensión de fármacos **anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios (adiro, Plavix, etc) según criterios médicos**

TRES DÍAS PREVIOS A LA COLONOSCOPIA

PUEDE TOMAR

Arroz, pastas y caldos
Carne, pescado a la plancha o hervido (con unas gotitas de aceite)
Galleta sin fibra y pan tostado
Zumos filtrados
Café, té e infusiones
Bebidas sin gas

NO PUEDE TOMAR

Ensaladas, verduras, legumbres y patatas
Carne y pescados en salsa
Frutas
Leches, grasas, pasteles y cereales.
Bebidas con gas.



24 horas antes de la prueba: DIETA LÍQUIDOSCLAROS (Agua, caldos filtrados, infusiones, té, bebidas sin burbujas, (Nestea®, Aquarius®, etc.).

CÓMO TOMAR PLEINVUE

INICIAR EL MISMO DÍA DE LA COLONOSCOPIA PROGRAMADA:

1era toma PLEINVUE


-A las **07:00** horas preparar **1ra toma** de PLEINVUE® (1/2 litro solución) y beber un vasito cada **15-20 minutos** (se recomienda beberlo frío), posteriormente beber ½ litro de líquidos claros (agua, acuarios, caldos, etc).
IMPORTANTE: Se puede alternar 1 vaso de la solución (PLEINVUE®) con un vaso de líquidos claros.

2da toma PLEINVUE

-A las **10:00** horas preparar **2da toma** de PLEINVUE® (Sobre A y B en 1/2 litro solución) y beber un vasito cada **15-20 minutos** (se recomienda beberlo frío), posteriormente beber ½ litro de líquidos claros (agua, acuarios, caldos, etc).
IMPORTANTE: Se puede alternar 1 vaso de la solución (PLEINVUE®) con un vaso de líquidos claros.



Video explicativo



A PARTIR DE LAS 12 H. DE LA MAÑANA PERMANECERÁ EN AYUNO TOTAL

Debe acudir acompañado y no puede conducir. Recuerde que el día de la exploración, si es **DIABÉTICO/A** al estar en ayunas, no debe tomar antidiabéticos orales ni se pondrá insulina.

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES

Si su ritmo defecatorio es habitualmente ESTREÑIDO, se le recomendará una PREPARACIÓN ESPECIAL conocida como “PREPARACIÓN COLÓNICA OPTIMIZADA”:

Tres días previos a la TOMA DE PLEINVUE se le pautará 1 sobre de MOVICOL solución oral cada 8 horas y deberá beber abundantes líquidos después de cada toma.

De esta manera lograremos el máximo rendimiento diagnóstico de la colonoscopia.

TRES (3) DÍAS PREVIOS A PREPARACIÓN CON PLEINVUE



1 sobre cada 8 horas

